

Information till föräldrar, rektorer och förskolechefer.

2020-04-01

## **Pollenallergi eller Coronainfektion?**

Barn med infektionssymtom ska inte vara i skolan/förskolan eftersom de förmodligen därigenom bidrar till spridning av sjukdom i samhället. Det är inte primärt för att skydda de andra barnen. Det är viktigare att sjuka barn inte träffar äldre sårbarare människor än att de undviker andra barn!

Covid-19 hos barn kan ge symtom (snuva, hosta, huvudvärk och trötthet) som påminner om allergiska besvär.

### **Hur ska man skilja på allergiska symtom från Covid-19?**

Om du misstänker att barnet har allergiska symtom (typiska symtom, som det brukar vara):

Behandla med allergi-/astmamedicin enligt ordination eller enligt tillverkarens rekommendationer. Om barnet inte har feber och symtomatisk behandling hjälper är det troligen allergiska symtom.

Vissa symtom är typiska för allergi och talar emot att det är orsakat av Coronavirus: Serienysningar, klåda i ögon, näsa och svalg samt pipande/väsande andning (astma)

Feber är aldrig orsakat av allergi, så tillkommer feber till "allergisymtomen" så ska barnet vara hemma.

Covid 19 är smittsamt. Därför är det i regel flera i familjen som är sjuka, åtminstone om symtomen funnits några dagar.

Sammanfattning:

### **Barn med misstänkt allergiska symtom kan vara i förskolan/ skolan om:**

- Barnet har typiska symtom.
- Barnet är feberfritt
- Symtomatisk medicinering hjälper
- Ingen annan i familjen har infektionssymtom
- Förhöjda halter av relevant pollen ([www.pollenkoll.se](http://www.pollenkoll.se) eller [www.pollenrapporten.se](http://www.pollenrapporten.se))

Borlänge 20-04-01. Råden bygger på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare Anders Lindblom, Region Dalarna. Lennart Persson, Skolläkare